

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

(45)

ノンパースD

(錠 辛夷清肺湯)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4)胃腸虚弱で冷え症の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〔用法・用量に関する注意〕

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

[成分・分量] (本品100錠中)


自社製別紙規格

日局	オウゴン末	2.5 g	日局	チモ	3.0 g	別水 紙性 規格 工 規格 ス
日局	サンシシ末	2.5 g	日局	オウゴン	3.0 g	
別紙規格	シンイ末	1.7 g	日局	サンシシ	3.0 g	
別紙規格	チモ末	2.5 g	日局	バクモンドウ	5.0 g	
別紙規格	ピヤクゴウ末	2.5 g	日局	セッコウ	5.0 g	
別紙規格	バクモンドウ末	4.1 g	日局	ショウマ	1.0 g	
別紙規格	セッコウ末	4.1 g	日局	シンイ	2.0 g	
別紙規格	ショウマ末	0.9 g	日局	ピヤクゴウ	3.0 g	
別紙規格	ピワヨウ末	1.7 g	日局	ピワヨウ	2.0 g	

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことがありますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10