



ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。  
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

34

錠剤 <sup>せいじょうほうふうとう</sup> 清上防風湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症：  
にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな（酒さ）

〔用法・用量〕

食間、又は空腹時、温湯で服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

自社製別紙規格					
日局	オウレン末	0.95 g	日局	オウレン	1.0 g
日局	サンシシ末	1.95 g	日局	ハッカ	1.0 g
日局	カンゾウ末	1.50 g	日局	サンシシ	2.0 g
日局	センキュウ末	2.45 g	日局	カンゾウ	1.5 g
日局	オウゴン末	2.45 g	日局	センキュウ	2.5 g
日局	キキョウ末	2.45 g	日局	オウゴン	2.5 g
別紙規格	ハッカ末	0.95 g	日局	キキョウ	2.5 g
別紙規格	ボウフウ末	2.45 g	日局	ボウフウ	2.5 g
局外生規	ケイガイ末	0.95 g	日局	ケイガイ	1.0 g
別紙規格	レンギョウ末	2.45 g	日局	レンギョウ	2.5 g
別紙規格	ビャクシ末	2.45 g	日局	ビャクシ	2.5 g
別紙規格	キコク末	1.50 g	日局	キコク	1.5 g

（清上防風湯エキス）  
別紙規格水製エキス  
2.5 g

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3957-2997

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10