

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



タケダ漢方便秘薬

漢方製剤〈大^{だい}黄^{おう}甘^{かん}草^{そう}湯^{とう}〉

特 徴

第2類医薬品

- タケダ漢方便秘薬は、生薬の“大黄”を主薬に“甘草”を配合した漢方処方「大^{だい}黄^{おう}甘^{かん}草^{そう}湯^{とう}」にもとづく製品で、大腸の運動をととのえ自然に近いお通じを促します。
- おやすみ前におのみになると、翌朝には自然に近いおだやかなお通じが得られます。
- 武田薬品が研究開発し、栽培している信州大黄を用いています。
- 甘草が信州大黄の作用を助け、おだやかな排便を促します。
- 便秘にともなうお腹の張り(腹部膨満)・吹き出ものなども緩和します。
- 黄かっ色の割線の入った錠剤です。



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
- 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4)胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5)次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、悪心・嘔吐

 - (2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合
- 3.1ヵ月以上連続して服用する場合は、医師または薬剤師に相談すること
- 4.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
下痢

効 能

- 便秘
- 便秘にともなう腹部膨満・吹き出もの・肌あれ・痔の緩和

(裏面へ続く)

用法・用量

次の量を1日1回、就寝前に水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	軽 い 便 秘 (2～3日便通がないとき)	頑 固 な 便 秘 (4日以上便通がないとき)
15歳以上	1錠～3錠	2錠～4錠
5歳～14歳	半錠～1錠半	1錠～2錠
5歳未満	服用しないこと	



錠剤には割線が入っているので、便通の具合をみながら、半錠ないし1錠ずつ増量(上記の最大量まで)または減量すること。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。
- (3) 次の人は服用量を控えめにすること。
体の衰弱している人、月経時の人
- (4) 初回は最小量を用いること。
- (5) 便通の改善がみられたら量を減らし、服用間隔をあけること。

成 分

1錠中に次の成分を含有する。

大黃甘草湯エキス散……………200mg

〔ダイオウ(大黃) 267mg
カンゾウ(甘草) 67mgより抽出〕


添加物：無水ケイ酸、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

＜成分に関連する注意＞

- (1) 本剤の服用により尿が橙色ないし赤色をおびることがありますが、ダイオウ(大黃)によるものなので心配ありません。
- (2) 生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) ピンの中の詰め物は、フタをあけた後ははすること(詰め物を再びピンに入れると湿気を含み品質が変わるものとなる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5) 服用のつどピンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7) 箱とピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入すること。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



便秘解消のアドバイス


便秘を治したい方に：

便秘薬を長期間にわたって使用すると、しだいに量を増やさないと効きにくなる傾向にあります。規則正しい排便の習慣をとりもどすため、次のことに注意しましょう。

1. 排便の習慣をつけましょう。
2. 腹筋を強くしましょう。
3. 食事に注意しましょう。



1日1回きまった時間(朝食後が最適)にトイレへ行きましょう。便意はがまんしないことです。



腹部マッサージ、体をねじる運動、水泳などで腹筋を強くして排便しやすくしましょう。



朝起きた時に、冷たい水や牛乳をのんだり、果物や野菜等せん維質の多い食品を多く食べて腸の運動を促しましょう。

包 装

65錠、120錠、180錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元



武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区区修町四丁目1番1号