

第2類医薬品



漢方煎専科

釣藤散

47

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 タキザワ漢方廠



## 漢方薬 釣藤散 「タキザワ」

16K

## ⚠️&lt;使用上の注意&gt;



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸虚弱で冷え症の人
  - 高齢者
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人
    - むくみ
  - 次の診断を受けた人
    - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【成分・分量】

チョウトウコウ	3.0g	ボウフウ	2.0g
キ ッ ビ	3.0g	キ ク カ	2.0g
ハ ン ゲ	3.0g	カンゾウ	1.0g
バクモンドウ	3.0g	ショウキョウ	1.0g
ブクリョウ	3.0g	セッコウ	5.0g
ニンジン	2.0g		

1日分(1包14.0g×2) 28.0g

## 【効能・効果】

体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

## 【用法・用量】

本品2包(1日分)を和紙袋入りのまま、水約600mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を2回に分けて、朝夕の空腹時に服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	煎液の1/2
15歳未満	服用しないこと

又は1日2回朝夕の空腹時に、本品1包(1回分)を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて上記と同様に製し服用してください。

年 齢	1回量
大人(15歳以上)	煎液全部
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180049



製造販売元

株式会社 タキザワ漢方

さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1  
 お客様相談室 ☎048-688-7923  
 受付時間：9時～18時(月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

☎0120-149-931