

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 当帰建中湯

トウキケンチュウトウ

ウチダの当帰建中湯は漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎じ薬で、特異な芳香があります。

成分・分量

ト	ウ	キ	4.0g			
ケ	イ	ヒ	4.0g			
シ	ョ	ウ	キ	ョ	ウ	1.0g
タ	イ	ソ	ウ	4.0g		
シ	ャ	ク	ヤ	ク	5.0g	
カ	ン	ゾ	ウ	2.0g		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸の弱い人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つ っぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があ らわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(下腹部痛に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

虚弱体質で疲労しやすく、直腹筋拘攣^注し、貧血の傾向あり、腹痛、下腹より腰背におよぶ疼痛、下血などを伴うもの。婦人の腹痛、子宮出血、月経痛、産後の衰弱、坐骨神経痛、腎石症、腰痛、脊椎カリエス

注)「^{こうれん}拘攣」とは筋肉がひきつり^{けいれん}痙攣することを指します。

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	1袋(1日分)につき水600mL(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300mL(約1合7勺)に煮つめ、袋をとり出し2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服する。
15歳未満	服用しないこと

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

* 新潟県上越市大湯区蛸ヶ池 1755-3