

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

41

錠剤

とう き し ぎゃく か ご しょうきょうとう
当帰四逆加呉生姜湯

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

むくみ

(7) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛 があらわれ、徐々に強くなる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：
冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛

〔用法・用量〕

食前1時間に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	6～8錠	3回

〔成分・分量〕（本品100錠中）

		自社製別紙規格				別紙規格 （逆加算） 水性生薬エキス 3.0g
日局	トウキ末	3.0g	日局	トウキ	3.3g	
日局	ケイヒ末	3.0g	日局	ケイヒ	3.3g	
日局	シャクヤク末	3.0g	日局	シャクヤク	3.3g	
日局	カンゾウ末	1.9g	日局	モクツウ	3.3g	
日局	ショウキョウ末	4.1g	日局	サイシン	2.3g	
別紙規格	モクツウ末	3.0g	日局	カンゾウ	2.3g	
別紙規格	サイシン末	1.9g	日局	タイソウ	5.5g	
別紙規格	タイソウ末	5.2g	日局	ゴシュユ	2.3g	
別紙規格	ゴシュユ末	1.9g	日局	ショウキョウ	4.4g	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管すること。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

～〔お問い合わせ先〕～

一元製薬株式会社「お客様相談室」
〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10
電話：03-3957-2997

○受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931



一元製薬株式会社
東京都豊島区要町3-4-10