

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。（裏面もお読み下さい。）
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

ウチダの 婦徳安潤

分包

フトクアンジュン

ウチダの婦徳安潤は、漢方処方にしたいが生薬を配合し抽出して得た水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

用法・用量

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人（15歳以上）	1包
15歳未満7歳以上	2/3包
7歳未満4歳以上	1/2包
4歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本品1日量〔3包（1包2.0g）〕中

トウキ	1.5g
センキュウ	1.5g
シャクヤク	2.0g
ブクリョウ	2.0g
ソウジュツ	2.0g
タクシャ	2.0g

当婦芍薬散料エキス……………2.70g

賦形剤として乳糖水和物・パレイショデンブン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mg、結合剤としてヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

第2類医薬品

ウチダの 婦徳安潤

フトクアンジュン

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。

販売元

株式会社 MORI PHARMACY

モリ薬局大塚店

東京都豊島区北大塚 3-25-16

伊納ビル 2F

製造販売元

株式会社ウチダ和漢薬

新潟県上越市大潟区蜘蛛ヶ池 1755-3