

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

## クラシエ当帰芍薬散錠 (トウキシヤクヤクサン)

### 特 徴

- 「当帰芍薬散」は、漢方の古典といわれる中国の医書「キンキョウリヤク金匱要略」の婦人妊娠病、婦人雑病に記載されている薬方です。
- 貧血ぎみの方の足腰の冷えや肩こり・むくみなどに効果があります。

### ⚠️ 使用上の注意



#### 相談すること

- 1.次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人  
(2)胃腸の弱い人  
(3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

### 効 能

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ



足腰の冷え症



肩こり

### 用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。

トウキ末	409mg
センキュウ末	409mg
シャクヤク末	546mg
ブクリョウ末	546mg
ソウジュツ末	546mg
タクシャ末	546mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。なお、ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)4錠分包の場合、1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管してください。なお、2日をすぎた場合には服用しないでください。



### 健康アドバイス

#### ●体を冷やさない



寒い冬に冷たいものを食べたりする食生活は冷えの原因になります。野菜を煮たり炒めたりした温野菜をとり、体の中から血行を良くするようにしましょう。

#### ●体は適度に動かしましょう



新陳代謝を高めるために大切なのは、体を動かすことです。ただし、運動の目的はあくまでも健康維持です。体に無理のない、マイペースでできる運動をしましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元 **クラシエ薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)