

とうきしゃくやくさん
当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44

当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）は冷えや貧血が気になり疲れやすい方の、生理前や生理中の女性ホルモンバランスの乱れなどによって起こるめまい・立ちくらみ、頭重に効くほか、更年期や産前・産後の体調不良など、女性の悩みに効く漢方薬です。血行不良や体内水分の偏りに作用するので、しもやけや足腰の冷え、むくみ、肩こり、耳鳴りなどにも効果があります。



● 使用上の注意 ●



❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 胃腸の弱い人

(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

● 用法・用量 ●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人(15歳以上)	1 包	2.0 g	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.3 g	
7歳未満4歳以上	1/2包	1.0 g	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.7 g	
2歳未満	1/4包	0.5 g 以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

● 成分・分量 ●

本品3包(6.0g)又は6.0gは

トウキ	1.5 g	ブクリョウ	2.0 g
センキュウ	1.5 g	ビャクジュツ	2.0 g
シャクヤク	2.0 g	タクシャ	2.0 g

上記より製した当帰芍薬散エキス（1/2量）4.0g（乾燥物換算で約2.0gに相当）を含有する細粒剤です。添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、ヒプロメロース、乳糖、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

●**保管及び取扱い上の注意**●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調が異なることがありますが、効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●**お問い合わせ先**●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
愛知県名古屋市昭和区円上町24-21