

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第 2 類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 排膿散

ハイノウサン

ウチダの排膿散は漢方処方にしたがって、生薬と生薬末を配合して製した散剤で、特異な芳香があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

- (1) 生後 3 ヶ月未満の乳児。
- (2) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師、歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

3. 5 ～ 6 日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量

本品 1000 g 中	
キ ジ ツ	400 g
シャクヤク末	400 g
キ キ ヨ ウ 末	200 g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

T E L 0 3 - 3 8 0 6 - 4 1 4 1

受付時間 9：00～17：30（土、日、祝日を除く）

効能・効果

局所症状が強く、全身症状が少ない疼痛を伴う化膿性の腫物で患部は緊張し、炎症浸潤熱感強く、堅硬の状態を示し排膿しがたきもの。

癰^{注1)}、癰^{注2)}、疔^{注3)}、皮下膿瘍^{注4)}、扁桃膿瘍、蓄膿症、歯齦炎^{注5)}、歯槽膿漏、肛囲炎^{注6)}、痔瘻、乳腺炎。

注1) 「癰^{せつ}」とは毛根を包んでいる部分と皮脂腺の急性炎症を指します。

注2) 「癰^{よう}」とは赤色を呈した痛みの強いはれものを指します。

注3) 「疔^{ちよう}」とは硬くて根が深いはれものを指します。

注4) 「皮下膿瘍^{ひかのうよう}」とは皮膚の下の 1 ヶ所に化膿が局限しているものを指します。

注5) 「歯齦炎^{しぎんえん}」とは歯茎の炎症を指します。

注6) 「肛囲炎^{こういえん}」とは肛門の周りの炎症を指します。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 1 ～ 2 回服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15 才以上）	3.0 g に卵黄 1 個を加えてよくかきまぜ温湯で服用する。
15 才未満 5 才迄	大人の 1/2 量
5 才未満	大人の 1/3 量

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 添付のサジはすり切りで、1 ばいが約 1 g です。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-3-4