

はい のう さんりょう  
サンワ 排膿散料 エキス細粒「分包」

サンワ排膿散料エキス細粒「分包」は、漢方処方「排膿散」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師、歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状   |
|-------|-------|
| 消 化 器 | 胃部不快感 |

- 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成 分

本品1日量 …… 3包（1包 2g）中  
排膿散料水製エキス …… 1.3g

|          |    |
|----------|----|
| キ ジ ツ …… | 3g |
| シャクヤク …… | 3g |
| キキョウ ……  | 1g |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

### 適応症

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：  
化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
TEL 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 1 包     |
| 7才～14才    | 2/3 包   |
| 4才～ 6才    | 1/2 包   |
| 4才 未 満    | 服用しないこと |

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1