

ぶくりょうたくしゃ とう  
**サンワ 茯苓沢瀉湯 エキス細粒「分包」**

サンワ茯苓沢瀉湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「茯苓沢瀉湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



### 使用上の注意



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

#### 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4才未満	服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 成 分

本品1日量 …………… 3包(1包 2g) 中  
 茯苓沢瀉湯水製エキス …………… 1.9g

ブクリョウ …………… 3.2g	ショウキョウ …………… 0.8g
タクシヤ …………… 3.2g	ケイヒ …………… 1.6g
ソウジュツ …………… 2.4g	カンゾウ …………… 1.2g

\*上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
 10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

### 適応症

体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、  
 渴きを覚えるものの次の諸症：  
 胃炎、胃腸虚弱



三 和 生 薬 株 式 会 社  
 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1