

切り口



切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

JPS

販売名：JPS防風通聖散料エキス錠N

漢方製剤

第2類医薬品

△ 使用上の注意

**× してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
**1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください** 他の下瀉薬(下剤) **2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

**相談すること**

**1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください** (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸が弱く下痢しやすい人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 **2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください** [皮膚] 発疹・発赤、かゆみ [消化器] 吐き気・嘔吐、食欲不快感、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 [精神神経系] めまい [その他] 発汗、動悸、むくみ、頭痛 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。[間質性肺炎] 階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。[偽アルドステロン症、ミオパチー] 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。[肝機能障害] 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。[腸間膜静脈硬化症] 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 **3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください** 下痢、便秘 **4.1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください** **5.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

**効能・効果** 体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症:高血圧や肥満に伴う動悸・肩こりのぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

**用法・用量** 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回4錠、7才以上15才未満1回3錠、5才以上7才未満1回2錠、5才未満 服用しないこと(用法・用量に関連する注意)(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)食間とは食後2~3時間を指します。

**成分・分量** 12錠中 防風通聖散エキス(1/2量)2.50g [日局トウキ 0.60g、日局シャクヤク 0.60g、日局センキュウ 0.60g、日局サンシシ 0.60g、日局レンギョウ 0.60g、日局ハッカ 0.60g、日局ショウキョウ 0.15g、日局ケイガイ 0.60g、日局ボウフウ 0.60g、日局マオウ 0.60g、日局ダイオウ 0.75g、日局ビャクジュツ 1.00g、日局キキョウ 1.00g、日局オウゴン 1.00g、日局カンゾウ 1.00g、日局セッコウ 1.00g、日局カッセキ 1.50g、日局硫酸ナトリウム水塩 0.75g に相当) 添加物:無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

**保管及び取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となり品質が変わることがあります。)(4)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果にはわかりません。(5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号



ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
 発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎ 045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

