

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

◆ウチダの漢方製剤◆

ウチダの 防風通聖散料 エキス散

ボウフウツウショウサンリョウ

ウチダの防風通聖散料エキス散は、漢方処方にしたがい生薬を配合し抽出して得た水製エキスを用いてやすく細粒としたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Table with 2 columns: 関係部位, 症状. Rows include 皮膚, 消化器, 精神神経系, その他.

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

Table with 2 columns: 症状の名称, 症状. Rows include 間質性肺炎, 偽アルドステロン症, ミオパチー, 肝機能障害, 腸間膜静脈硬化症.

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

Table with 2 columns: 年齢, 1回量. Rows include 大人(15歳以上), 15歳未満.

〈用法・用量に関連する注意〉

添付のサジ1ぱいが約1gです。

成分・分量

本品1日量(6g)中

防風通聖散料エキス.....3.22g

Table listing ingredients and their amounts: トウキ, シャクヤク, センキュウ, サンシシ, レンギョウ, ハッカ, ショウキョウ, ケイガイ, ボウフウ, マオウ, ダイオウ, 硫酸ナトリウム, ビャクジュツ, キキョウ, オウゴン, カンゾウ, セッコウ, カッセキ.

賦形剤として乳糖水和物・パレイシヨデンブ、吸湿防止剤として軽質無水ケイ酸、その他1成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\* 新潟県上越市大潟区蜘蛛ヶ池 1755-3