

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方薬

ぼうふうつうしょうさん  
**防風通聖散エキス錠〔大峰〕**

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

🗨 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢、便秘
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 《効能又は効果》

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：  
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

## 《用法及び用量》

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満7歳以上	3錠	
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

### 《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 《成分及び分量》

防風通聖散エキス錠〔大峰〕の1日量(12錠)中には下記生薬より得た防風通聖散エキス(1/2量)2750mgを含む。

トウキ………0.6g ショウキョウ…0.2g ビャクジュツ…1.0g  
シャクヤク…0.6g ケイガイ………0.6g キキョウ………1.0g  
センキュウ…0.6g ボウフウ………0.6g オウゴン………1.0g  
サンシシ……0.6g マオウ………0.6g カンゾウ………1.0g  
レンギョウ…0.6g ダイオウ ……0.75g セッコウ………1.0g  
ハッカ………0.6g 無水ボウショウ…0.375g カッセキ………1.5g  
添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、二酸化ケイ素を含有する。

## 《保管及び取扱い上の注意》

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(ビン包装の場合は、密栓して保管してください。)
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。  
大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」  
〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574  
電話 (0745) 22-3601  
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574