



第2類医薬品

漢方煎専科

防風通聖散料

62

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして

株式会社 タキザワ漢方廠

漢方薬 防風通聖散料 「タキザワ」

18K

△＜使用上の注意＞

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬 (下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|---------------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| 精神神経系 | めまい |
| その他 | 発汗、動悸、むくみ、頭痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 (*) | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 (*) |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢、便秘
4. 1ヵ月位 (便秘に服用する場合には1週間位) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

| | | | |
|--------|------------|-----------|-------------|
| トウキ | 1.5g | マオウ | 1.5g |
| シャクヤク | 1.5g | ダイオウ | 1.5g |
| センキュウ | 1.5g | 乾燥硫酸ナトリウム | 0.75g |
| サンシシ | 1.5g | ビャクジュツ | 2.0g |
| レンギョウ | 1.5g | キキョウ | 2.0g |
| ハツカ | 1.5g | オウゴン | 2.0g |
| ショウキョウ | 0.5g | カンゾウ | 2.0g |
| ケイガイ | 1.5g | セッコウ | 2.0g |
| ポウフウ | 1.5g | カッセキ | 3.0g |

1日分 (1包14.625g×2) 29.25g

【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症 (副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの (にきび)、肥満症

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包 (1回分) を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、次の量を服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 |
|------------|---------|
| 大人 (15歳以上) | 全量 |
| 15歳未満 | 服用しないこと |

※用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180353



製造販売元
株式会社 タキザワ漢方
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室 ☎048-688-7923
受付時間：9時～18時 (月～金)

タキザワ漢方



ホームページ:takizawa.asia

副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
☎ 0120-149-931

