

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

# 強 補 中 医 王<sup>®</sup> 散

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

感冒、微熱、盗汗<sup>a)</sup>

<sup>a)</sup>盗汗：ねあせのことを示します。

## 用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	
4歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤4.5g又は3包中

サ イ コ	0.245g	} エキス……………0.963mL (固形物として0.049g)	カンゾウ末	0.978g
ト ウ キ	0.245g		ショウキョウ末	0.245g
オ ウ ギ	0.489g	} エキス……………0.797mL (固形物として0.049g)	ビャクジュツ末	1.467g
シ ヨ ウ マ	0.122g		ニンジン末	0.734g
タ イ ソ ウ	0.245g		サ イ コ 末	0.978g
チ ン ピ	0.489g			
ト ウ キ	0.734g			

- ・本剤は淡黄褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

強補中医王散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1