

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



第2類医薬品

# 漢方製剤 阪本漢法の 麻子仁丸

K-48

ましにんがん

漢方処方には古方、後世方及び経験方を含めて何千という処方がありますが、この中でも漢方関係の成書の多くに今まで納められている様な処方は、長い年月その効果が保証されてきた処方といえましょう。  
当社では特に金匱要略、傷寒論からこの処方を選んで、原典に基づいて蜂蜜で練ったのみ易い丸剤にしました。この処方は緩和下剤で常習便秘のもの、ことに老人、病後の人などで、体液が枯渇して皮膚や粘膜に滋潤の不足して便秘する方によく、尿量が多くて、大便秘結という症状でお悩みの方におすすめ致します。



## 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 消 化 器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

2

4

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
下痢

## ■効能・効果

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

## ■用法・用量

| 年齢                                             | 1回服用量                                                                       | 1日服用回数                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 成人（15歳以上）<br>7歳以上15歳未満<br>4歳以上7歳未満<br>3歳以上4歳未満 | 20～30丸<br>成人の $\frac{2}{3}$ 量<br>成人の $\frac{1}{2}$ 量<br>成人の $\frac{1}{3}$ 量 | 3回、食前又は食間 <sup>注1</sup> に服用する。 |
| 3歳未満                                           | 服用しないでください。                                                                 |                                |

<sup>注1</sup> 食間とは、食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉  
定められた用法・用量を厳守してください。

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

## ■成分・分量 本品90丸(1丸100mg)中

| 成 分       | 含 量     | 成 分      | 含 量     |
|-----------|---------|----------|---------|
| マシニン末     | 1,500mg | 日局 コウボク末 | 600mg   |
| 日局 シャクヤク末 | 600mg   | 日局 ダイオウ末 | 1,200mg |
| キジツ末      | 600mg   | キョウニン末   | 600mg   |

添加物：コメデンプン、ハチミツ、ヒドロキシプロピルセルロース、セラック

## ■保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ■お客様相談室

TEL (06)6131-1300  
(祝祭日を除く 月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元  
一阪本の赤まむし総本舗一

株式会社 阪本漢法製薬

大阪市北区曽根崎2丁目7番4号  
<http://www.sakampow.com>