

服用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

阪本漢法の 麻子仁丸

ましにんがん

第2類医薬品

漢方処方には古方、後世方及び経験方を含めて何千という処方がありますが、この中でも漢方関係の成書の多くに今まで納められている様な処方は、長い年月その効果が認められてきた処方といえます。

当社では特に「傷寒論(しょうかんろん)」、「金匱要略(きんきようりゃく)」からこの処方を選んで、原典に基づいて蜂蜜で練った服用し易い丸剤にしました。

この処方は緩和な下剤で常習便秘のもの、ことに高齢者、病後の人などで、体液が枯渇して皮膚や粘膜の滋潤が不足して便秘する方によく、尿量が多くて、大便が硬いという症状でお悩みの方におすすめ致します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■効能・効果

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

■用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	20～30丸	いずれも1日3回 食前又は食間に 服用してください。
15才未満 7才以上	大人の2/3量 13～20丸	
7才未満 4才以上	大人の1/2量 10～15丸	
4才未満 3才以上	大人の1/3量 6～10丸	

*3才未満は服用しないでください。

*食間とは食後2～3時間を指します。

*微温湯又は水で服用してください。

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (3)定められた用法・用量を厳守してください。

■成分・分量

成人1日量90丸(1丸100mg)中

成 分	分 量	成 分	分 量
(マシニン) 麻子仁末	1,500 mg	日局 コウボク末	600 mg
日局 シャクヤク末	600 mg	日局 ダイオウ末	1,200 mg
(キジツ) 枳実末	600 mg	(キョウニン) 杏仁末	600 mg

添加物：コメデンプン、ハチミツ、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、白色セラック

成分・分量に関連する注意

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸剤の色が多少異なることがありますが、品質に問題はありません。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)濡れた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。(水分は丸剤の色や形が変わる原因になります。)
- (5)本剤はハチミツで練って製造していますので、まれに丸剤どうしがくっつくことがあります。品質に問題はありません。そのような場合は、容器ごと軽く振ってから服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

お客様相談室

電話 06-6131-1300 (祝祭日を除く 月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元

株式会社 阪本漢法製薬

大阪市北区曽根崎2丁目7番4号

<http://www.sakampow.com>