

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

## ◆ウチダの漢方製剤◆

# ウチダの 六味丸

ロクミガン

ウチダの六味丸は漢方処方にしたがって、生薬を配合し粉末化して丸剤としたものです。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状            |
|------|---------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること(分包剤のみ)。

### ●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社ウチダ和漢薬 お客様相談センター

TEL 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

### 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症：  
排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用する。

| 年齢        | 1回量     |
|-----------|---------|
| 15才以上     | 20丸     |
| 15才未満7才以上 | 13丸     |
| 7才未満4才以上  | 10丸     |
| 4才未満2才以上  | 6丸      |
| 2才未満      | 服用しないこと |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

### 成分・分量

本品 6.154g (60丸 1日分) 中

(乾燥仕上り量 6g)

|       |    |                        |        |
|-------|----|------------------------|--------|
| ジオウ   | 6g | } 以上の割合で混合し<br>粉末化したもの | 5.128g |
| サンシュユ | 3g |                        |        |
| サンヤク  | 3g |                        |        |
| タクシャ  | 3g |                        |        |
| ブクリョウ | 3g |                        |        |
| ポタンビ  | 3g |                        |        |

丸薬の結合剤としてハチミツを含有する。

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。



株式会社 ウチダ和漢薬

\*新潟県上越市大潟区蜘蛛池 1755-3