

カップで
簡単!

マヤドーの煎じ薬



① 熱湯150mLに
ティーバッグを入れ



② かき混ぜながら
しばらく待てば...



③ 1回分の出来あがり!
※ティーバッグは
1日以内に3回使えます

【効能・効果】咳、気管支炎、喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）を
ともなうせき、喘鳴、痰、体質改善

ネオ快気湯
長引く咳
体質からの改善に

✓風邪のあと咳だけが残る
✓夜中になると咳で眠れない

和漢のチカラを科学し、あなたへ



茶剤・1袋

第②類医薬品

HR249E-01

この説明書は本剤と
ともに保管し、服用の際
にはよくお読みください。

茶剤 ネオ快気湯

第②類医薬品

生薬製剤 20.0g×1袋

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

👤 **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。（1）医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）（4）胃腸の弱い人（5）発汗傾向の著しい人（6）高齢者（7）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（8）次の症状のある人：高熱、むくみ、食欲不振、吐き気、嘔吐、排尿困難（9）次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐
精 神 経 系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌 尿 器	排尿障害

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】咳、気管支炎、喘鳴（ぜーぜー、ひゅーひゅー）をともなうせき、喘鳴、痰、体質改善
【用法・用量】○通常成人1袋を3回、熱湯約150mlずつで振り出し、1日3回食前又は食間に服用してください。○成人1袋に水約600mlを加え約1/2量に煎じ詰め、1回約100ml、1日3回食前又は食間に温服することもできます。○8歳～15歳は成人の1/2量、4歳～7歳は成人の1/3量宛服用してください。

<用法・用量に関連する注意>（1）用法・用量を厳守してください。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1袋（成人1日量）中に次の生薬を20.0g含有しています。

マオウ3.0g/ショウキョウ0.8g/シャクヤク1.4g/カンゾウ1.0g/ケイヒ1.4g/サイシソ0.8g/ゴミシ1.0g/ハンゲ1.0g/キョウニン1.0g/ブクリョウ1.0g/コウボク1.2g/サイゴ1.0g/オウゴン1.0g/タイソウ0.8g/キキョウ1.2g/オンジ1.2g/モッカ1.2g

<成分・分量に関連する注意>本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）（4）一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元

ロート製薬グループ



摩耶堂製薬株式会社
神戸市西区玉津町居住65-1

お問合せ先：「くすりの相談室」電話（078）929-0112

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日、弊社休日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先：0120-149-931



使用
期限

製造
番号

HR249F-01