

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類
医薬品

漢方薬 リバイチンS[®]

特 徴

- 中高年になり身体機能が低下しますと、疲労しやすい、腰痛、肩こり、手足のしびれなどの症状があらわれます。
- リバイチンSはこのような症状を改善するほか、排尿困難や頻尿、かすみ目といった中高年特有の症状にも良く効きます。
- 新陳代謝機能の低下を改善し、強壮作用のある薬用ニンジンをはじめ、漢方薬「八味地黄丸」の各生薬を配合しています。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	のぼせ、どうき

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

効 能

疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で時に口渇がある次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、倦怠感、肩こり



用法・用量

次の量を食後に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	5錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児には服用させないでください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

成 分

15錠（成人の1日服用量）中

成 分	含 量
ジ オ ウ（地 黄）	800 mg
サ ン ヤ ク（山 薬）	400 mg
ブ ク リ ヨ ウ（茯 苓）	400 mg
サ ン シ ュ ユ（山 茱 萸）	400 mg
タ ク シ ャ（沢 瀉）	400 mg
ボ タ ン ピ（牡 丹 皮）	400 mg
ケ イ ヒ（桂 皮）	133 mg
加 エ プ シ 末（加工附子末）	67 mg
ニ ン ジ ン（人 参）	400 mg

添加物として乳糖、ゼラチン、炭酸Ca、タルク、ポビドン、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、セラック、アラビアゴム、酸化チタン、ヒマシ油、白糖、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）。



包 装

150錠 300錠 450錠

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03（3370）7174（代表）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

（独）医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15