

生薬工キス散

雲仙散

第②類医薬品

☆雲仙散は、筋肉や関節の炎症を鎮め、体の中にある余分な水分を調節し、痛みを緩和すると共に、血液障害や新陳代謝障害など痛みの原因となっている症状を改善します。

☆服用しやすい、携帯に便利なアルミ分包包装です。



使用上の注意



してはいけないこと


(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (8) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (9) 次の症状のある人
食欲不振、悪心・嘔吐、軟便、下痢、排尿困難
- (10) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病
- (11) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、悪心・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌 尿 器	排尿障害

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

効能・効果

神経痛・リウマチ・関節炎・筋肉痛・腰痛・背痛・五十肩

用法・用量

次の量を、食間に、水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人	1 包	3 回
8歳～15歳	1 / 2 包	
4歳～7歳	1 / 3 包	
3歳以下	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食間：食後2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

服用方法



成分・分量

1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキス30.0g含有しています。

成 分		成 分		成 分	
カンゾウ	5.0g	キョウニン	5.0g	ボタンピ	6.0g
ソウジュツ	5.0g	ボウイ	8.0g	トウニン	5.0g
ケイヒ	6.0g	ボウフウ	5.0g	ダイオウ	5.0g
マオウ	10.0g	シャクヤク	8.0g	ヨクイニン	6.0g
ショウキョウ	5.0g	カッコン	10.0g		
タイソウ	5.0g	ブクリョウ	6.0g		

添加物としてカルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



その他

本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2145 神戸市西区玉津町居住65-1 電話 (078)929-0120

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1