

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

生薬製剤

販売名：強活腎散 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】膀胱カタル、腎臓病、腰痛、
高血圧、糖尿病、脚気、早漏、陰萎

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に、コップ
半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
10歳以上15歳未満	2/3包	
5歳以上10歳未満	1/2包	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】1日量3包(4.5g)中

サンヤク……737.7mg	} エキス……3.437mL (固形物として73.8mg)
タクシャ……184.4mg	
ケイヒ末……170.0mg	
サンヤク末…680.2mg	
ソウジュツ末……1.7mg	
タクシャ末……510.1mg	
ブクリヨウ末…510.1mg	
ボタンピ末…510.1mg	
サンシュユ末…680.2mg	
ジオウ末……1360.4mg	
ニンジン末………1.7mg	
チンピ末………1.7mg	

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

薬店名
真漢方堂

発売元
株式会社エムズサイエンス
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1
問合せ先
ルソイル 0120-531-866(フリーダイヤル)
(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

製造販売元
剤盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
0120-149-931(フリーダイヤル)