この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【生薬製剤】

強 治 胸® 散

第２類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後３ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(5) 次の診断を受けた人。

肝臓病

(6) インターフェロン製剤で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症　状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) １ヵ月位(感冒に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

頭痛、感冒、気管支炎、中耳炎、咳止

用法・用量

次の量を食前又は食間[注)]に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年　齢	1回量		1日服用回数
	容器入りの場合	分包品の場合	
大　人	1.5g(添付のサジ1杯)	1包	3回
10歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	2/3包	
5歳以上10歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	1/2包	
５歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	1/3包	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

(4) 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

（裏面へ）

成分・分量

本剤4.5g又は3包中

ショウキョウ……0.070g
タ イ ソ ウ……0.021g
ハ ン ゲ……0.246g
} エキス……0.584mL（固形物として0.105g）

ショウキョウ……0.061g
タ イ ソ ウ……0.733g
ハ ン ゲ……0.305g
} エキス……3.266mL（固形物として0.122g）

オ ウ ゴ ン 末……0.610g
カ ン ゾ ウ 末……0.610g
ソウジュツ末……0.610g
ブクリョウ末……1.223g
ニ ン ジ ン 末……0.610g
サ イ コ 末……0.610g

・本剤は淡黄褐色で、特異なにおいを有し、味はわずかに甘く苦い散剤です。
・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) 分包品において１包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、２日以内に服用すること。

強治胸散は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。
剤盛堂薬品株式会社　学術部
電話　073(472)3111(代表)
受付時間　9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
剤盛堂薬品株式会社
〒640-8323　和歌山市太田515番地1