

【漢方薬】

強 風 弱 散<sup>®</sup>

◆ 強風弱<sup>しょうふうじやく</sup>(フウジャク)散は傷寒論という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の散剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

下痢、胃腸カタル<sup>a)</sup>

<sup>a)</sup>胃腸カタル：胃腸炎のことを示します。

用法・用量

次の量を食前又は食間<sup>注)</sup>に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

<sup>注)</sup>「食間」とは食後2～3時間を指します。

| 年 齢        | 1回量             | 1日服用回数 |
|------------|-----------------|--------|
| 大 人        | 1.5g(添付のサジ1杯)   | 3回     |
| 10歳以上15歳未満 | 大人の2/3の量(1.0 g) |        |
| 5歳以上10歳未満  | 大人の1/2の量(0.75g) |        |
| 5歳未満       | 大人の1/3の量(0.5 g) |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。
- 生後3ヵ月未満の乳児には服用させないこと。

## 成分・分量

本剤4.5g中

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ケイヒエキス  | 2.178mL(固形物として0.145g) |
| カンゾウ末   | 0.691g                |
| ケイヒ末    | 1.038g                |
| ビャクジュツ末 | 0.691g                |
| ブクリョウ末  | 0.691g                |
| ニンジン末   | 0.691g                |
| カンキョウ末  | 0.346g                |
| チンピ末    | 0.207g                |

- ・本剤はだいたい褐色で、特異なおいを有し、味は甘い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

強風弱散は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよく相談下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1