

【漢方薬】

四物血行[®]散

◆ 四物血行(シモツケッコウ)散^{わざいきょくこう}は和剤局方^{わざいきょくほう}という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の散剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸の弱い人。
 - 下痢しやすい人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、食欲不振、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - 1ヵ月位(子宮出血に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効能・効果

貧血に伴う全身倦怠、低血圧、月経異常、婦人科諸疾患に起因する神経症状(目まい、のぼせ、耳鳴り、頭痛、不眠、憂うつ症、不安感)、子宮出血、産前・産後及び妊娠による貧血、妊婦の強壮、産婦の強壮

用法・用量

次の量を食前又は食間^{注)}に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	1.5g(添付のサジ1杯)	3回
12歳以上15歳未満	大人の2/3の量(1.0 g)	
7歳以上12歳未満	大人の1/2の量(0.75g)	
4歳以上 7歳未満	大人の1/3の量(0.5 g)	
4歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤4.5g中

ジ	オ	ウ	0.25g	} エキス.....4.62mL (固形物として0.30g)
シ	ャ	ク	ヤク.....0.25g	
セ	ン	キ	ユウ.....1.50g	
ト	ウ	キ	1.50g	

シヤクヤク末.....0.20g
ビヤクジュツ末.....2.00g
ブクリョウ末.....2.00g

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

四物血行散は漢薬の特性を活かした漢方薬ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。
あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、漢方薬のことをご理解いただいている医師・薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。
剂盛堂薬品株式会社 学術部
電話 073(472)3111(代表)
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1