

【糖尿病用生薬製剤】

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

シノミッテル® カプセル

第2類医薬品

- ◆ シノミッテルカプセルは、糖尿病を改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ シノミッテルカプセル中のカクコン・カロコンは血糖増加による口渴(口のかわき)を抑え、ゴミシ・バクモンドウ・ブクリョウ・カンゾウ・トウキ・ジオウ・オウレン・ニンジン・エゾノレンリソウは糖尿病の回復を手助けします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の医薬品を服用している人。

血糖降下剤

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下痢

4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

糖尿病、血糖増加による口渴^{a)}

^{a)}口渴：口のかわきのことを示します。

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

^{注)}「随時服用」とは食前・食間(食後2～3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	3～5カプセル	2～3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

(裏面へ)

成分・分量

本剤15カプセル(3g)中

オウレン…0.006g	トウキ…0.396g	} 水製エキス…0.6g
カッコン…0.198g	ニンジン…0.0396g	
カロコン…0.792g	バクモンドウ…0.792g	
カンゾウ…0.078g	ブクリョウ…0.0006g	
ゴミシ…0.396g	エゾノレンリソウ…3g	
ジオウ…0.792g		
オウレン末…0.156g	ブクリョウ末…1.056g	
カンゾウ末…0.792g	ニンジン末…0.396g	

添加物として青色1号、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

- ・本剤は青色(キャップ)とみず色(ボディ)の二色のカプセル剤で、その内容物は茶褐色で、特異なおいを有し、味は苦い粉末です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

薬と養生

シノミッテルカプセルは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1