

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう保管してください。

第2類医薬品

漢方生薬製剤



ホンノー

ホンノー錠

ホンノー錠は、9種の和漢薬を服用しやすいように錠剤にしたもので、打撲・骨折・捻挫により生じた内出血及び炎症を消散します。

負傷後、ホンノー錠を服用すると内出血及び諸症状（熱、はれ、痛み、黒いあざ等）を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の医薬品を服用している人。
瀉下薬（下剤）

2. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、下痢

3. 1週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

打撲・骨折・捻挫による内出血及び炎症を消散する。

（裏面へ続く）

【用法・用量】

大人 1 日 3 回、毎食間、水または白湯にて服用。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大 人 (15歳以上)	10 錠	3 回
7 歳以上 15歳未満	5 錠	
5 歳以上 7 歳未満	3 錠	
5 歳未満の乳幼児	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間のことをいいます。

〈用法・用量に関する注意〉

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。
3. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 1 日量 (8.0g) 中

日局オウバク末	0.3g	日局シャクヤク末	0.8g
日局ブクリョウ末	0.8g	日局ダイオウ末	0.7g
日局ソウジュツ末	0.9g	日局トウキ末	0.9g
日局カンゾウ末	0.8g	日局センキュウ末	1.0g
日局シュクシャ末	0.8g	添加物として、水酸化アルミナマグネシウム、カルメロースを含有する。	

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

【消費者相談窓口】

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元 **ホンノ一薬品株式会社**

お客様相談窓口 フリーダイヤル **0120-41-0317**

営業時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.urban.ne.jp/home/honnoo/index.htm>

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木 3-46-16

