

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

止 血

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。

生後3カ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感、下痢

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

口内出血、歯齦出血、喀血、鼻血、痔出血、子宮出血、月経過多症の止血

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成 人	1包	3 回
7～15歳	1/2包	
4～6歳	1/3包	
2～3歳	1/6包	
2歳未満	1/10包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の中間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包中（1包2.0g）中、下記生薬を含有します。

ボタンピ末	1.30g	オウレン末	0.49g
シャクヤク末	0.32g	オウバク末	0.32g
トウキ末	0.32g	サンシシ末	0.32g
オウゴン末	0.32g	ジオウ末	1.30g
チモ末	0.32g	アキョウ末	0.32g
ゲンジン末	0.32g	カロコン末	0.32g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因となったり品質が変わることがあります。）

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7