

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

し けつ
止 血
(生 薬 製 剤)

◆「止血」は口内出血、歯齦出血、喀血、鼻血、痔出血、子宮出血、月経過多症を改善するために、12種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

生後3 ヲ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
- （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、下痢

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

口内出血、歯齦出血※）、喀血、鼻血、痔出血、子宮出血、月経過多症の止血

※）「^{し 齦}歯齦出血」とは、歯ぐき出血のことを示します。

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数	食間とは… 食後2～3時間を 指します。
成 人	1 包	3 回	
7歳以上15歳以下	成人の1/2量		
4歳以上 7歳未満	成人の1/3量		
2歳以上 4歳未満	成人の1/6量		
2歳未満	成人の1/10量		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包（6g）中、下記生薬を含有します。

ボ タ ン ピ 末	1.30g	オ ウ レ ン 末	0.49g
シャクヤク末	0.32g	オ ウ バ ク 末	0.32g
ト ウ キ 末	0.32g	サ ン シ シ 末	0.32g
オ ウ ゴ ン 末	0.32g	ジ オ ウ 末	1.30g
チ モ 末	0.32g	ア キ ヨ ウ 末	0.32g
ゲ ン ジ ン 末	0.32g	カ ロ コ ン 末	0.32g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 たてばやししょうかくどう
株式会社 建林松鶴堂
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7