

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

順 血 湯

(生薬製剤)



使用上の注意



相 談 す る こ と

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸の弱い人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人

むくみ

- (6) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

脳溢血、眩暈、頭痛、耳鳴

用法・用量

本品1袋を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1日分の1／3量	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。

成分・分量

本品1袋（25.0g）中、下記生薬を含有します。

ニンジン…3.0g シャクヤク…3.0g ソウジュツ…3.0g

トウキ …3.0g カンゾウ …1.0g セイヒ …3.0g

キ皮皮 …3.0g ビャクシ …3.0g ウヤク …3.0g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室

電 話 03-3843-3833

受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7