

日本薬局方

クレゾール石ケン液

Saponated Cresol Solution

500mL



販売元
オールジャパンドラッグ株式会社



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

2012年10月(記載要領変更に伴う改訂)

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる]

1. 原液では使用せず、必ず薄めて使用すること。

2. 次の部位には使用しないこと。

目、目のまわり、口、唇等には使用しないこと。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 患部が広範囲の人。
 - 4) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

手指・創傷面の殺菌・消毒
便所、便器、ごみ箱、たんつぼ、浄化そう等、疾病の予防のために必要と思われる場所の殺菌・消毒

用法・用量

次のように水で希釈して洗浄する。

1. 手指の消毒の場合 : 2 % (本剤の 50 倍液)
2. 創傷面の殺菌の場合 : 1 % (本剤の 100 倍液)
3. 便所等の消毒の場合 : 3 % (本剤の 33 倍液)

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 外用にのみ使用し、内服しないこと。
3. 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。

4. 本品は、使用濃度においてもクレゾール臭を有するので、適用箇所に十分注意すること。また、クレゾール臭を長時間吸わないように注意すること。

5. 本剤は水道水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるが、このような場合には、上澄み液を使用すること。

<希釈方法>

33 倍液 : 本剤を 30 mL とり、水 1L にうすめる。
50 倍液 : 本剤を 20 mL とり、水 1L にうすめる。
100 倍液 : 本剤を 10 mL とり、水 1L にうすめる。

犬猫などの忌避剤としての使用はできません。

成分・分量

本品は、クレゾール 42～52 vol% を含む。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。
2. 小児の手が届かないところに保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる)
4. 原液が皮膚に付着した場合は、刺激症状を起こすので、ただちに石けん水と水で洗い流すこと。また、刺激症状(炎症)が起きた場合は医師の診療を受けること。(原液を取扱う場合は、保護めがね、ゴム手袋等を着用すること。)

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



外装フィルム

ガラス: 瓶
金属: キャップ

使用期限

製造番号



4 975175 015455