

気化性防殺虫剤

第1類医薬品

パナプレート®

■有効成分：ジクロロボス……………1枚中 19.2g
 ■塩化ビニル樹脂他 その他成分 ……1枚中 100.8g
 ■内容量：……………1枚 120g
 [注意—人体に使用しないこと]

用法及び用量



1. 本剤は、開封したのち下記の要領に従い使用すること。

使用場所	対象害虫	使用量	使用法
下水槽 浄化槽		8~12m ³ の容積当 たり1枚	マンホール 内または蓋 の裏側に吊 す。
便 所			
長時間 留まらない 区域が 店 舗 ホテル 旅館 工場 倉庫 倉庫 テント 地下室	ハエ・蚊	25~30 m ³ の容積 当たり1枚 (目安、6~ 8畳、高さ 2.5mに 相当)	天井または 壁に吊す。 (高さ2m位 に)
ゴミ箱 厨芥箱	ハエ ゴキブリ	5~10m ³ の容積当 たり1枚	蓋の裏側に 貼付する。
戸棚 キャビ ネット	ハエ・蚊 ゴキブリ		天井または 壁から吊す。 容器内に吊 す。

2. 同一場所に2枚以上使用する場合は、それぞれ少なくとも3m以上の間隔で吊してください。
3. 開封した本剤の有効期間は3ヵ月です。
4. 使用中、殺虫効果が低下したと思われたら、本剤の表面に付着したゴミまたは水分等を紙や布片で拭き取ると再び効果が見られます。

使用期限

ロットNo.



製 造 国 際 衛 生 株 式 有 限 公 司

販売元 東京都中央区日本橋本町4-14-7

お客様相談窓口 電話 03-3667-6711(代)

時間 平日 0900~1700

(除く、土曜、日曜日、祭日、年末年始)

2012年6月改訂

記載内容をよく読んでお使いください。
 必要な時に読めるように保管してください。

使用上の注意事項

- してはいけないこと
 (守らないと副作用・事故が起こりやすくなります)
 ①居室(客室、事務室、教室、病室を含む)では使用しないこと。なお、居室にある戸棚・キャビネット内などでも使用しないでください。
 ②飲食する場所(食堂など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)では使用しないでください。
- 相談すること
 ①万一、身体に異常(倦怠感、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、多汗等)が起きた場合は、使用を中止し、この文書を持って本剤が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けて下さい。
 本剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤(2-ピリジジナルドキシムメチオサイド製剤)が有効であると報告されています。
 ②今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
- ③表面に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、この文書を持って眼科医の診療を受けてください。
- その他の注意
 ①定められた用法及び用量を厳守してください。
 ②小児や家畜動物のとどかない範囲で使用してください。
 ③愛玩動物(小鳥、魚等)の直ぐそばに吊るすことは避けてください。
 ④有害であるから飲食物、食器、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにしてください。
 ⑤本剤を多量に又は頻繁に取り扱う場合は、ゴム手袋を着用してください。
 ⑥本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、石けんと水でよく洗ってください。
 ⑦使用直前に開封し、有効期間そのまま吊り下げておいてください。
 ⑧一度開封したら必ず使用するようになっています。

【保管及び取扱い上の注意】

- ①保管する場合は、直射日光を避け、小児や家畜動物のとどかない冷暗所に保管してください。

【廃棄の方法】

- ①不要になった包装はプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。
- ②開封した本剤の有効期間は通常2~3箇月です。有効期限が過ぎ、効力がなくなったらプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。



PE.PET