

記載内容をよく読んでお使い下さい。

使用上の注意事項

- してはいけないこと
(守らないと副作用・事故が起こりやすくなります)

① 飼育(玄窓、明窗席、教窓、戸窓を含む)では使用しないこと。なお、窓枠にある戸枠・キャビネット内などでも使用しないでください。

② 飲食する場所(食事など)及び飲食物が露出している場所(調理場、食品庫、貯蔵加工場など)では使用しないでください。

【相談すること】

- ① 万一、身に付いたまま(接着性、粘着、ぬれい、吐き気、嘔吐、頭痛、下痢、多汗等)が持続した場合は、使用を中止し、この文書を持って本品が有機リン系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けてください。
本剤の殺虫剤としては、硫酸カトロビン製剤及びAMF 製剤(エビレジナルドキシムメチオノグリド製剤)が有効であると報告されています。

② 多量で誤飲や化粧品係によるアレルギー症状(例:かぜ感、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

③ 衣類に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又は温湯で洗浄してください。なお、症状が重い場合には、この文書を持って医療機関の診療を受けてください。

● その他の注意

- ① 定められた用法及び用量を厳守してください。
② 小児や家畜動物のとどかない範囲で使用してください。
③ 動物動物(小鳥、魚等)の直ぐそばに用いることは避けてください。
④ 有病であるから飲食物、食料、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにしてください。
⑤ 本剤に多量に又は頻繁に取り扱う場合は、ゴム手袋を用意してください。
⑥ 不剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、石けんなどでよく洗ってください。
⑦ 未開封前に開封し、有効期間その後のままで下けておいてください。
⑧ 一度開封したら必ず使用するようにしてください。

【保管及び取扱い上の注意】

① 保管する場合は、直射日光を避け、小児や家畜動物のとどかない冷暗所に保管してください。

【廃棄の方法】

- ① 不用になった包装はプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。
② 開封した本剤の有効期間は通常2~3ヶ月です。有効期間が過ぎ、効力が弱くなったらプラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨ててください。

氣化性防殺虫剤

第1類医薬品

ハナフレートハーフ

- 有効成分：ジクロルボス……………1枚中 9.6g
■ 塗化ビニル樹脂他その他成分……………1枚中 50.4g
■ 内 容 量 ………………1枚 60g

【注意】一人体に使用しないこと



用法及び用量
1. 本剤は開封したのち下記の要領に従いて使用すること。

使用場所	対象虫	使用量	使用法
下水槽 浄化槽	蚊	4~6m ³ の容積当たり1枚	マンホール内 または蓋の裏 側に吊す。
便 所	ハエ、蚊	10~15m ³ の容積当たり1枚 (目安、3~4畳、高さ 2.5mに相当)	天井または 壁に吊す。 (高さ2m 位に)
屋外の場所 の少ない店舗 が 店舗 ホ テ ル 旅 館 工 食 畜 倉 庫 テ ント 地下室	ハエ、蚊 ゴキブリ 戸締 キセキ ネット	2~5m ³ の容積当たり1枚	蓋の裏側に 貼する。 天井または壁 から吊す。 蓋内に吊す。

2. 同一場所に2枚以上使用する場合は、それぞれ少なくとも3m以上の間隔で吊してください。

3. 開封した本剤の有効期間は3ヵ月です。

4. 使用中、殺虫効果が低下したと思われたら、本剤の表面に付着したゴミまたは水分等を拭や布片で拭き取ると再び効果が見られます。

使用期限

ロットNo.



製造
販売元

東京都中央区日本橋本町4-14-7

お客様相談窓口 電話 03-3667-6711(代)

平日 09:00 ~ 17:00

(除く、土、日曜日、祝祭日)



4 515307 020300