

効能 蚊、ブユ(ブヨ)、サンバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、
イエダニ、マダニ、ツツガムシの忌避

有効成分(原液100mL中) ディート 12.0g
添加物: 1,3-ブチレングリコール、二酸化ケイ素、ポリ
リソレベート60、エタノール、香料。噴射剤: LPG

保管及び取扱上の注意 ●直射日光の当たらない涼
しい所に保管すること。●**小児の手のとかない所に保管**
すること。●年のざびを防ぐため、水廻りや湿気の多い
場所に置かないこと。●次の物には付着させないこと
(変質する可能性がある)。食物、食器、玩具、床や家具など
の塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、
化粧品、皮革製品、マニキュア等。●捨てる時は、火気の
ない戸外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。●使用
期限(戸外で噴射音が聞こえない)をすぎた製品は使用しないこと。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、
危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。②火
気を使用している室内で大量に使用しない
こと。③高温にすると破裂の危険があるた
め、直射日光の当たる所やストーブ、コン
ロ等の近くなど温度が40度以上となる所
に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。
⑤使い切って捨てること。
高圧ガス:LPガス

ガス抜きキャップボックス(ガス抜き注意事項) ●中身を
使いつつから、火気のない戸外で行うこと。●本品のキャ
ップ以外は使用しないこと。●中身が残っ
ている場合、液の飛散により周囲が汚れ
ることがあるので、差し支えない所で行
うこと。●人にかからないように注意す
ること。●**「ガス抜き」の方法** ①図のよう
にボタンをつまむ。②つまんだままボタ
ンを押し、時計回りに90度まわす。●噴
射音が完全に消えるまで行うこと。●産
品の際は各自治体で定められた方法に
従うこと。●排出を止める場合は、ボタ
ンを元の位置に戻すこと。



外装フィルム、安全カバー、
キャップ、ボタン

製造販売元 **MUHI** 株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神井16番地

お客様相談窓口076-472-0911(平日9:00~17:00)

MUHI

医薬品

虫よけ成分12%配合

さらっと
パウダー
in

ムヒの 虫よけ ムシパール®PS



販売名: ムヒの虫よけムシパールPS

第2類医薬品

使用方法 ●初めて使用する時は、キャップ上部の安全カバー
を取り除くこと。●使用前に在る6~10回程程度振って、豚、足
などには約15cmの距離から噴霧すること。●噴霧気体を直
接吸入しないように注意すること。●冷えて痛くなること
があるため、同じ箇所を連続して3秒以上噴霧しないように注
意すること。**用法・用量** ●蚊、ブユ(ブヨ)、サンバエ、アブ
ナンキンムシ、イエダニ、マダニの忌避: 本剤の適量を顔、腕、
腕、足など皮膚の露出部分に噴霧する。顔面、首筋などの場合
には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布すること。●ツツ
ガムシの忌避: 本剤の適量を4~6時間前、皮膚の露出部分及
びはきものヤスポンのそばなどにも塗らねばならない。顔面、
首筋などの場合には適量を一度手のひらに噴霧してから塗
布すること。**用法・用量に関連する注意** ●本剤は吸血虫に対す
る忌避剤であって、疾病の治療薬ではない。●湿汗した使用
後をさげ、蚊、ブユ(ブヨ)等が戸外での使用時、必要な場
合にのみ使用すること。●小児(12才未満)に使用する場合
には、保護者等の指導監督のもとで、以下の回数を目安に使用
すること。なお、顔には使用しないこと。●6カ月未満の乳児
には使用しないこと。●6カ月以上2才未満は、1日1回、2才
以上12才未満は、1日1~3回。●本剤は外用にのみ使用し、内服
しないこと。●定められた用法・用量を厳守すること。●目
に入った、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることにな
り、塗布した手で目をこすらないこと。●万一目に入った
場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこ
と。また、具合が悪くなる等の症状があらわれた場合には、直
ちに本剤にアトとエタノールが含まれていることを医師
に告げて診療を受けること。●目や口の周囲、粘膜や傷口
など肌の弱い部分には使用しないこと。腫れやかかさかたは、
直ちに水でよく流すこと。●万一肌に異質を感じたときは、
直ちに使用を中止すること。●本品を噴霧又は塗布した後は、
経過時間や使用時の使用者の発汗状況や状況を確認でき、
適宜、本品を再度使用すること。●ツツガムシに対する音
響効果は認められているが、薬剤耐性に際するツツガムシ、
長脚などを使用し、肌を露出しないような場所に立ち入
る前に塗布すること。●シャツ、ズボンなどの衣服に噴霧する場
合、繊維の種類によっては本剤により変質する可能性がある。
合成繊維は変質しやすいので注意すること。●ツツガムシ
などの上に直接噴霧しないこと(生地で傷む場合がある)。

使用上の注意 してはいけないこと(守らないと
副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しない
こと 創傷面、目の周囲、粘膜等(指図すること)
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆ
み、かぶれ等)を起こしたことのある人。(3) 湿疹や
ただれのある人。2. 使用後、次の症状があらわれた
場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中
止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者
に相談すること 皮膚: 発疹・発赤、かゆみ、はれ等

本品は透明フィルムで包装されています。
内容量 200mL 第一石油類 80mL 火気厳禁 TS14
⑥登録商標 (副作用被害救済制度 ☎0120-149-931)

200mL
第2類医薬品