

細胞賦活用薬

医薬品

錠剤 **ルミンA[®]-100γ**

特徴

本品の有効成分クリプトシアニンO.A.コンプレックスは、組織細胞を賦活し、その生長を促進させ、細網内皮系の機能を高め、細動脈の血行を旺盛にします。この作用で体に出来た炎症や症状は元の状態になるように修復されますので、急性化膿性疾患、末梢神経性疾患、急性・慢性湿疹、一般創傷、熱傷、凍傷、汗疱性白癬に効果があります。



急性化膿性疾患



末梢神経性疾患



急性・慢性湿疹



一般創傷



熱傷、凍傷



汗疱性白癬

使用上の注意



相談すること



- 次の方は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい。
 - 妊婦または妊娠していると思われる方。
 - 医師の治療を受けている方。
- 服用中または服用後は、次のことにご注意下さい。
 - 1カ月間服用して効果があらわれないときは、服用を中止して医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - 本剤の服用により、食欲不振、発熱、創傷の分泌増加などの症状があらわれた場合には服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい。
- ※3. 服用に際して、次のことにご注意下さい。
 - 幼児または小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつまらないよう、保護者の指導監督の下に服用させて下さい。
 - 3歳未満の乳幼児には、のどにつまる恐れがありますので服用させないで下さい。

効能・効果

急性化膿性疾患、末梢神経性疾患、急性・慢性湿疹、一般創傷、熱傷、凍傷、汗疱性白癬

※ 用法・用量

1日1回1錠を空腹時に白湯又は冷水で服用して下さい。
効果があらわれない場合には、1回2錠を服用して下さい。

成分・分量

本品1錠中

クリプトシアニンO.A.コンプレックス100 μ gを含有しています。

添加物としてアラビアゴム、タルク、炭酸水素ナトリウムを含有しています。

保管及び取り扱い上の注意

1. 小児の手のとどかないところに保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに密栓して保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
4. 添付文書は、必要な時読めるよう大切に保管して下さい。

その他の注意

1. 本剤は、薬剤の吸収性を良くするために特別な製造法を用いております。そのために錠剤の表面が多少まだらに見えることがありますが、効果には変わりありません。
2. 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。

問い合わせ先

1. 購入した薬局・薬店
2. 鬨林原生物化学研究所 なんでも相談室
住所：〒700-0907 岡山市下石井1-2-3
電話：086-801-7560
FAX：086-224-0650
受付時間 電話：午前9時～午後5時
(土、日、祝日を除く)
FAX：常時可

製造販売元

鬨林原生物化学研究所
住所：〒700-0907 岡山市下石井1-2-3