

平成21年4月改訂

平成19年4月作成

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。
また、必要なとき読める様に大切に保管
すること。

細胞賦活用薬

第3類医薬品

錠剤 **ルミンA[®]-50γ**

特 徴

本品の有効成分クリプトシアニンO.A.コンプレックスは、組織細胞を賦活し、その生長を促進させ、細網内皮系の機能を高め、細動脈の血行を旺盛にします。この作用で体に出来た炎症や症状は元の状態になるように修復されますので、アレルギー性疾患、食欲不振、倦怠、貧血、一般虚弱体質、凍傷、熱傷、一般創傷、急性化膿性疾患、末梢神経性疾患に効果があります。



アレルギー性疾患



食欲不振、倦怠
貧血



一般虚弱体質



凍傷、熱傷
一般創傷



急性化膿性疾患



末梢神経性疾患



使用上の注意



相談すること

1. 次の方は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 妊婦または妊娠していると思われる方。
 - (2) 医師の治療を受けている方。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。
食欲不振、発熱、創傷の分泌増加
 - (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 服用に際して、次のことにご注意下さい。
 - (1) 幼児または小児に服用させる場合は、薬剤がのどにつまらないよう、保護者の指導監督の下に服用させて下さい。
 - (2) 3歳未満の乳幼児には、のどにつまる恐れがありますので服用させないで下さい。

裏面に続く

効能・効果

アレルギー性疾患、食欲不振、倦怠、貧血、一般虚弱
体質、凍傷、熱傷、一般創傷、急性化膿性疾患、末梢
神経性疾患

用法・用量

1日1回1錠を空腹時に白湯又は冷水で服用して下さい。
効果があらわれない場合には、1回2錠を服用して下さい。

成分・分量

本品1錠中

クリプトシアニンO.A.コンプレックス50 μ g を含有
しています。

添加物としてアラビアゴム、タルク、炭酸水素ナト
リウムを含有しています。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管
して下さい。
2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れかえないで下さい（誤用の原因になっ
たり品質が変わる）。

その他の注意

1. 本剤は、錠剤の表面が多少まだらに見えることがあ
りますが、効果に変わりはありません。
2. 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。

問い合わせ先

1. 購入した薬局・薬店
2. 株式会社 林原生物化学研究所 なんでも相談室
住所：〒700-0907 岡山市北区下石井1-2-3
電話：086-801-7560
FAX：086-224-0650
受付時間 電話：午前9時～午後5時
（土、日、祝日を除く）
FAX：常時可

製造販売元

株式会社 林原生物化学研究所
住所：〒700-0907 岡山市北区下石井1-2-3

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>



0120-149-931