

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起りやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

他の強心剤

併用すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れかえないで下さい

誠徳心

有効成分・分量 1日量(4粒67mg)中

ジャコウ	1.0mg	ニンジン末	10.0mg
ゴオウ	5.0mg	レイヨウカク末	5.0mg
センゾ	5.0mg	ロクジョウ末	2.5mg
サフラン	5.0mg	d-ボルネオール	2.5mg
ユウタン	2.5mg	ジンコウ末	10.0mg

添加剤：シリチン酸、着色料、全糖

効能・効果 どうき・息切れ・氣つけ


用法・用量 大人15才以上……1回2粒
1日2回服用する。

(注) かみずに服用して下さい。

注意

1. 服用に際しては、使用上の注意をよく読んで下さい。
2. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

配置期限



大和中央製薬株式会社
大阪市北八木町1丁目6-16
TEL 0744 (22) 2043

誠徳心

成分・分量

1日量(4粒)中

JP ジャコウ	1.0mg	JP ニンジン末	10.0mg
ゴ オウ	5.0mg	レイヨウカク末	5.0mg
セン ソ	5.0mg	d-ボルネオール	2.5mg
サフラン	5.0mg	沈 香 末	10.0mg
ユウタン	2.5mg	鹿 茸 末	2.5mg

効能・効果

息切れ・氣つけ・どうき

用法・用量

大人15才以上……1回2粒
1日2回服用する

注意

1. 小児の手のとどかない所に保管してください。
2. 服用に際しては、添付文書をよく読んでください。
3. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管して保管してください。

製造発売元

大和中央製薬株式会社

大阪市北八木町1丁目6-16

◆使用上の注意

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
- (2) 医師の治療を受けている人。

2. 服用に際して、次のことに注意すること

- (1) 本剤は創薬に該当する成分も含まれているので定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かみずに服用すること。
- (3) 他の強心薬とは同時に服用しないこと。
- (4) 小児には服用させないこと。

3. 服用中又は服用後は、次のことに注意する

- (1) 本剤の服用により、悪心・嘔吐等の症状があらわれることがある。この症状が特に重い場合には服用を中止すること。
- (2) 数日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

4. 保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 服用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。