

第2類医薬品

# 六神丸



気付・息ぎれ・どろき

三星製薬株式会社  
奈良県御所市153番地

品名 **六神丸**第2類  
医薬品**効能・効果**

動悸、息切れ、気付け

**用法・用量**大人 1回1粒 1日3回食間または食後に、  
水または白湯にて服用して下さい。**有効成分 1日量(3粒)中**

ゴオウ	2.0 mg	羚羊角末	1.625 mg
センソ	3.0 mg	牛胆	1.5 mg
サフラン	0.75 mg	沈香末	3.5 mg
鹿茸末	2.0 mg	龍腦	1.0 mg
ニンジン末	3.5 mg		

添加物としてサリチル酸、寒梅粉、薬用炭、アラビアゴム末、白色セラックを含有する。

**注 意**

1.小児に服用させないこと 2.服用が適さない場合がある  
ので、服用前には必ず医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
3.小児の手の届かない所に保管すること 4.直射日光の当たらない、  
湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること 5.服用に際して、  
添付の注意書をよく読むこと 6.他の容器に入れかえないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わる) 7.期限を過ぎた製品は服用しないこと

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

# ⚠ 使用上の注意

## ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

- 1.小児には服用させないこと
- 2.本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないこと 他の強心薬



## 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (2)医師の治療を受けている人。
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

裏面もお読みください

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる  
ない場合は服用を中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### [用法・用量に関連する注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守すること。  
(2)かまずに服用すること。

### 保管及び取扱い上の注意

- 1.小児の手のとどかない所に保管すること
- 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 3.他の容器に入れかえないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 4.期限を過ぎた製品は服用しないこと



中仕切り



キャップ

製造販売元 (お問い合わせ先)

三星製薬株式会社

奈良県御所市153番地

TEL 0745-65-2130

