

販売名 **六神丸** 第2類医薬品

**効能効果**：動悸、息切れ、気付け

**用法用量**：大人1回1粒 1日3回食間または食後に、水又は白湯にて服用して下さい。

**有効成分** 1日量(3粒中)

ゴオウ…………… 2.0 mg 羚羊角末…… 1.625 mg

センソ…………… 3.0 mg 牛胆…………… 1.5 mg

サフラン……… 0.75 mg 沈香末…………… 3.5 mg

鹿茸末…………… 2.0 mg 龍腦…………… 1.0 mg

ニンジン末……… 3.5 mg

添加物としてサリチル酸、寒梅粉、薬用炭、アラビアゴム末、白色セラックを含有します。

**注意**

- 1.小児に服用させないこと。
- 2.服用が適さない場合があるので、服用前には必ず医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 3.小児の手の届かない所に保管すること。
- 4.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 5.服用に際して添付の注意書をよく読むこと。
- 6.他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 7.期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



製造販売元  
(お問い合わせ先)

**三星製薬株式会社**

奈良県御所市153番地  
TEL. 0745-65-2130

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり  
副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 小児には服用させないこと
2. 本剤を服用している間は次の医薬品を服用しないこと 他の強心薬



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(2) 医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

裏面もお読みください

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる  
場合は服用を中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### [用法・用量に関連する注意]

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かまわずに服用すること。

### 保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手のとどかない所に保管すること
2. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
3. 他の容器に入れかえないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わる)
4. 期限を過ぎた製品は服用しないこと



中仕切り



キャップ

製造販売元 (お問い合わせ先)

三星製薬株式会社

奈良県御所市153番地

TEL 0745-65-2130

