

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



**貧血用薬**

**鉄・ビタミンB<sub>12</sub>・葉酸配合**

**腸溶性糖衣錠**

ヘマニックは、赤血球をつくるのに必要な鉄・ビタミンB<sub>12</sub>・葉酸をバランス良く配合した、貧血治療薬です。一般に鉄剤は、胃に負担がかかると言われていますが、本品は胃では溶けずに腸で初めて溶けるように被膜を施した腸溶性糖衣錠です。

**【使用上の注意】**



**してはいけないこと**



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

**本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。**

他の貧血用薬

**相談すること**



**1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。**

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状                     |
|------|-------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ               |
| 消化器  | 悪心・嘔吐、食欲不振、<br>胃部不快感、腹痛 |

- (2)2週間位服用しても症状がよくならない場合。

**3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。**

便秘、下痢

## 【効能・効果】

貧血。

## 【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

| 年 齢         | 1 回 量   | 1 日服用回数 |
|-------------|---------|---------|
| 大人（15才以上）   | 2 錠     | 1 回     |
| 8 才以上 15才未満 | 1 錠     |         |
| 8 才未満       | 服用しないこと |         |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないでください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は水又はぬるま湯で、かまずに服用してください。

## 【成 分】（2錠中）

溶性ピロリン酸第二鉄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79.5mg

シアノコバラミン（ビタミンB<sub>12</sub>）・・・・・・・・・・・・・・・・ 50μg

葉酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2mg

添加物としてゼラチン、タルク、炭酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色102号、黄色5号、アラビアゴム、カルナウバロウ、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、リン酸水素Caを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

1) 購入した薬局・薬店

2) お客様相談室

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14

電話：03（3986）0613

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

**全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14  
営業所 東京都文京区大塚5-6-15