

第2類医薬品

ウチダのきささげTU 500g

日本薬局方 キササゲ 中国産 寸

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

脱酸素剤封入

効能・効果 尿量減少

使用上の注意 ロット：0002954 使用期限：0000.00

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - むくみのある人。
 - 心臓又は腎臓に障害のある人。
- 服用後、かわった症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)



製品情報はこちら

<お問合せ先>お客様相談センター
電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

発売元

株式会社ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里4-3-3

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1 MTL

キササゲ