

2021(令和3)年4月改訂

第3類医薬品

日本薬局方

サンキライ

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止しこの製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位：皮膚 症状：発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

尿量減少

【成分・分量】

1日量(20g)中

日本薬局方 サンキライ 20g

【用法・用量】

年齢	1日量
大人 (15歳以上)	本品20gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮詰め、滓をこして取り去り食前または食間3回に分服する。
15歳未満	服用しないこと

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)

※浸煎剤は腐敗を防ぐため冷所に保存してください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

お客さま相談窓口

本製品内容についてのお問合わせは、下記にお願い申し上げます。

電話：(076)431-7017 FAX：(076)431-7013
受付時間：午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 (株)延寿堂

〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3