

あけくち

日本薬局方

カンゾウ

販売名 山本漢方かんぞう

【特徴】

本品は生薬の煎じ薬、ティーバッグタイプ

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 高齢者。
(3) 次の症状のある人。
むくみ
(4) 次の診断を受けた人。
腎臓病、高血圧、心臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

効能又は効果

激しい咳、咽喉痛の緩解

用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	3gの煎液 の1/3	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1日量3g(1包)を、水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、滓(カス)を取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 1包(3g)中

成 分	分 量
日本薬局方 カンゾウ	3.0g

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【内 容 量】 60g (3g×20包)

【その他】

味・香り・色等に多少の差異が出ることがあります。

製造販売元

㊦ 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

http://www.kanpo-yamamoto.com