

第②類医薬品

〈生薬配合〉鎮咳去痰剤

アイロミン®シロップ

〈せき〉は、こじらせると治りにくくなり、体力を消耗して身体を衰弱させますので、早期に適切な治療を行うことが大切です。

〈アイロミンシロップ〉は、頑固なせきを鎮める〈鎮咳剤〉と濃厚なたんを排出しやすくし、しかも胃腸障害を起こすことが少ない生薬の〈去痰剤〉を配合したシロップ剤ですので、効きめが早く、頻発する〈せき〉と〈たん〉を緩和する効果があります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 過量服用・長期連用しないでください。
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
--------------------------------	---

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘

【効 能・効 果】

せ き、 た ん

【用 法・用 量】

大人（15歳以上）		1回	5 mL
11歳以上15歳未満		1回	3 mL
8歳以上11歳未満		1回	2.5 mL
8歳未満		服用しないこと	

1日3回または4回服用してください。1日3回の場合は毎食後あるいは食前服用、4回の場合は更に就寝前にもう1回服用してください。

1日5～6回服用しても差し支えありませんが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。（添付の計量コップをお使いください）

【用法・用量に関する注意】

1. 8歳未満の乳幼小児には服用させないでください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 定められた用法用量を守ってください。

【成 分・分 量】 1日量(30mL)中

ジヒドロコデインリン酸塩.....30mg
（リン酸ジヒドロコデイン）

dl-メチルエフェドリン塩酸塩.....72mg
（dl-塩酸メチルエフェドリン）

グアイフェネシン.....270mg

キキョウ流エキス（キキョウ 2,000mgに相当）.....2mL

桜皮流エキス（桜皮 2,000mgに相当）.....2mL

その他、添加物として、白糖、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物（サッカリンナトリウム）、塩化ナトリウム、L-グルタミン酸ナトリウム及び安息香酸ナトリウムを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

〔受付時間 8:30～17:00
（土、日、祝日を除く）〕