

ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。



第②類医薬品

〈生薬配合〉鎮咳去痰剤

アイロミン®シロップ

〈せき〉は、こじらせると治りにくくなり、体力を消耗して身体を衰弱させますので、早期に適切な治療を行うことが大切です。

〈アイロミンシロップ〉は、頑固なせきを鎮める〈鎮咳剤〉と濃厚なたんを排出しやすくし、しかも胃腸障害を起こすことが少ない生薬の〈去痰剤〉を配合したシロップ剤ですので、効きめが早く、頻発する〈せき〉と〈たん〉を緩和する効果があります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振		
精神神経系	めまい		

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能・効 果】

せ き、 た ん

【用 法・用 量】

大人（15歳以上）	1回 5mL
11歳以上15歳未満	1回 3mL
8歳以上11歳未満	1回 2.5mL
8歳未満	服用しないこと

1日3回または4回服用してください。1日3回の場合は毎食後あるいは食前服用、4回の場合は更に就寝前にもう1回服用してください。

1日5～6回服用しても差し支えありませんが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。（添付の計量コップをお使いください）

【用法・用量に関する注意】

1. 8歳未満の乳幼児には服用させないでください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 定められた用法用量を守ってください。

【成 分・分 量】 1日量(30mL)中

ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	72mg
グアイフェネシン	270mg
キキョウ流エキス（キキョウ 2,000mgに相当）	2mL
桜皮流エキス（桜皮 2,000mgに相当）	2mL

その他、添加物として、白糖、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、塩化ナトリウム、L-グルタミン酸ナトリウム及び安息香酸ナトリウムを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元： **松田薬品工業株式会社**

愛媛県松山市河野中須賀318

電話 (089)994-1333

受付時間 8:30～17:00
(土、日、祝日を除く)