



ご使用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬 アイロミン[®]液

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります)
3. 過量服用・長期連用しないでください。
(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中のの人。
- (4)高齢者。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	恶心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、口のかわき

[効能・効果]

せき、たん

[用法・用量]

大人(15歳以上) 1回 5.0mL

11歳以上 15歳未満 1回 3.0mL

8歳以上 11歳未満 1回 2.5mL

1日3回または4回服用してください。

1日3回の場合は毎食後あるいは食前服用、4回の場合は更に就寝前にもう1回服用してください。

1日5~6回服用しても差し支えありませんが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

(添付の計量カップをお使いください)

[用法・用量に関する注意]

1. 8歳未満の乳幼小児には服用させないでください。

2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

3. 定められた用法用量を守ってください。

[成分・分量] 1日量(30mL) 中

リン酸ジヒドロコデイン 30mg

dL-塩酸メチルエフェドリン 75mg

グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg

マレイン酸クロルフェニラミン 12mg

無水カフェイン 150mg

南天実流工キス 5mL
(南天実 5,000mgに相当)

キキョウ流工キス 1mL
(キキョウ 1,000mgに相当)

セネガ流工キス 1mL
(セネガ 1,000mgに相当)

その他、添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸、塩化Na、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na及び香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元

松田薬品工業株式会社

愛媛県松山市河野中須賀318 電話(089)994-1333

[受付時間 8:30~17:00 (土・日・祝日を除く)]