

暗褐色のトローチで、1日量：8粒中に次の成分を含有します。

成 分	分 量	作 用
マオウエキス	340mg (原生薬換算：2,040mg)	かぜのせきや上気道炎(咽・喉頭炎)によるせきを鎮めてのどの炎症をおさえます。
キキョウ流工キス	400mg	たんのせきをよくして気道をなめらかにするとともに、のどの諸症状を改善します。
セネガ流工キス	200mg	

添加物として、黒砂糖、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、トメントール、香料を含有します。
※本剤は、和漢薬工キスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3～4回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年 齢	大人(15歳以上) 及び8歳以上	5歳以上8歳未満	5歳未満
1 回 量	1粒ずつ2粒まで	1粒	服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)5歳以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえないよう、よく注意してください。
- (4)本剤は、トローチ剤ですのでかまないでください。また、そのままのみこまないでください。
- (5)スティックパック開封後は速やかに服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

アスゲン製薬株式会社 医薬安全情報課 名古屋市東区泉二丁目28-8 TEL:052-931-1212(代表)

服用に際しては、この説明文書をよく読んでください。

▲【使用上の注意】**❌【してはいけないこと】**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

■【相談すること】

- 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6)次の症状のある人
高熱
- (7)次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合