

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) スティックパック開封後は、すみやかに服用してください。


せき・こえ・のど
アベシリンE

第②類医薬品

第②類医薬品

トローチ
24粒

アベシリンE



和漢薬エキス(マオウ・キキョウ・セネガ)配合
せき・こえ・のど

発売元

アスゲン製薬株式会社

名古屋市東区泉二丁目28-8 製造番号

製造販売元

高市製薬株式会社

使用期限

奈良県高市郡明日香村野口10

お問い合わせ先 アスゲン製薬(株)

☎ 0120-935-758(フリーダイヤル)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 0120-149-931

アベシリンE

第②類医薬品

服用に際しては、この説明文書をよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱 (7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合 (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

鎮咳去痰薬

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3~4回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年 齢	大人(15歳以上)及び8歳以上	5歳以上8歳未満	5歳未満
1 回 量	1粒ずつ2粒まで	1粒	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス	340mg (原生薬換算量 2,040mg)	気管支をひろげ、せきを鎮めます。 また、のどの炎症をやわらげます。
キキョウ流エキス	400mg	気道粘液の分泌を促進し、たんを出しやすくします。
セネガ流エキス	200mg	

添加物: 黒砂糖、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、ℓ-メントール、香料
※本剤は和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。